

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



### Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:  
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE DEPARTEMENT DE MEDECINE.  
DEUXIEME ANNEE DE MEDECINE DE L'ANNEE 2015/2016  
MODULE D'HISTOLOGIE/EMBRYOLOGIE. . Dr. HARHAD- Dr. ADJOURI- Dr. HAMOUM

---

## **Les ganglions nerveux**

### **Plan**

#### **I- Généralités**

#### **II- Ganglions cérébro-spinaux**

##### **A- Définition**

##### **B- Origine embryologique**

##### **C- Structure histologique**

##### **D- Cytophysiologie**

#### **III- Ganglions végétatifs**

##### **A- Définition**

##### **B- Origine embryologique**

##### **C- Structure histologique**

##### **D- Cytophysiologie**

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE DEPARTEMENT DE MEDECINE.  
DEUXIEME ANNEE DE MEDECINE DE L'ANNEE 2015/2016  
MODULE D'HISTOLOGIE/EMBRYOLOGIE. . Dr. HARHAD- Dr. ADJOURI- Dr. HAMOUM

---

## Les ganglions nerveux

### I- Généralités:

Le système nerveux peut être divisé sur **le plan anatomique** en:

**Système nerveux central (SNC)** : représenté par l'encéphale (cerveau, cervelet, tronc cérébral) et la moelle épinière.

**Système nerveux périphérique** : représenté par les nerfs et les ganglions.

Il existe des nerfs crâniens (12 paires), et des nerfs rachidiens auxquels s'ajoutent, les fibres constituant les voies efférentes du système nerveux autonome.

**Sur le plan physiologique on distingue:**

**Le système nerveux somatique de relation** : appareil locomoteur et organes de sens.

**Le système nerveux autonome:** associé aux viscères.

### II- Les ganglions cérébro-spinaux:

**A- Définition:** ce sont des amas de cellules (neurones) réalisant des renflements sur le trajet des nerfs. C'est des **centres nerveux périphériques** situés sur le trajet:

\* Des nerfs sensitifs crâniens, ce sont : **les ganglions cérébraux.**

\*Des racines postérieures sensibles des nerfs rachidiens, ce sont : **les ganglions spinaux (rachidiens).**

**B- Origine embryologique:** au 18<sup>ème</sup> jour du développement embryonnaire apparaît la **plaque neurale** à partir de l'**ectoblaste**, formant en suite une **gouttière neurale**, ses bords externes forment: **les crêtes neurales**, La fermeture de la gouttière donne le **tube neural**

2017/2018

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE DEPARTEMENT DE MEDECINE.  
DEUXIEME ANNEE DE MEDECINE DE L'ANNEE 2015/2016  
MODULE D'HISTOLOGIE/EMBRYOLOGIE. . Dr. HARHAD- Dr. ADJOURI- Dr. HAMOUM


---

**\*Le tableau ci-dessous, représente les crêtes ganglionnaires et les placodes qui participent à la formation de certains des ganglions des nerfs sensitifs crâniens:**

<b>Placode Crête ganglionnaire</b>	<b>Ophtalmique et maxillo- mandibulaire</b>	<b>Hyo- mandibulaire</b>	<b>Auditive</b>	<b>Epibranchiale</b>
<b>Crête du trijumeau</b>	<b>Ganglion de GASSER V</b>			
<b>Crête de l'acoustico- facial</b>		<b>Ganglion géniculé VII</b>	<b>Ganglion de CORTI et SCARPA VIII</b>	
<b>Crête du glosso- pharyngien et du vague</b>				<b>Ganglion d'ANDERSCH et d'EHRENITTER IX Ganglion jugulaire et plexiforme X</b>

\*Sur une coupe horizontale au niveau du tronc d'un embryon humain de 06 semaines, la crête ganglionnaire subit comme le mésoblaste para-axial une segmentation transversale régulière (**métamérisation**).

\* **Le somite** se divise en 03 segments



```

graph LR
    A[Le somite se divise en 03 segments] --> B[Sclerotome]
    A --> C[Dermatome]
    A --> D[Myotome]
  
```

**Un métamère= neuromère (étage médullaire) + ganglion + dermatome.**

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE DEPARTEMENT DE MEDECINE.  
DEUXIEME ANNEE DE MEDECINE DE L'ANNEE 2015/2016  
MODULE D'HISTOLOGIE/EMBRYOLOGIE. . Dr. HARHAD- Dr. ADJOURI- Dr. HAMOUM

---

**Les ébauches des ganglions spinaux ou rachidiens ont une double origine :**

- \*- **Neurectoblastique** des crêtes ganglionnaires.
- \*- **Mésenchymateuse** provenant du sclérotome (mésoblaste des somites).



**Une coupe frontale au niveau du tronc d'un embryon humain de 06 semaines.**

### **C- Structure histologique :**

Les ganglions cérébraux et les ganglions rachidiens présentent une structure histologique identique, on prendra comme type de description un **ganglion rachidien**.

**Sur une coupe longitudinale du ganglion rachidien examiné en microscopie optique au faible grossissement, on peut reconnaître 03 sortes de constituants :**

- 1-Des formations conjonctivo-vasculaires.
- 2-Des cellules.
- 3-Des fibres nerveuses.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE DEPARTEMENT DE MEDECINE.  
DEUXIEME ANNEE DE MEDECINE DE L'ANNEE 2015/2016  
MODULE D'HISTOLOGIE/EMBRYOLOGIE. . Dr. HARHAD- Dr. ADJOURI- Dr. HAMOUM

---

### Une coupe longitudinale du ganglion rachidien

#### 1-Les formations conjonctivo-vasculaires :

**\*Une capsule périphérique conjonctivo-élastique**, qui enveloppe le ganglion et qui est à l'origine :

- **Des capsules logeant les cytones des cellules nerveuses** : c'est les **capsules péricellulaires**. Ces capsules comportent 02 couches, l'une **périphérique fibrillaire** faite de fibres de collagènes concentriques, et l'autre **interne cellulaire** faite de fibroblastes.

- **Des gaines enveloppant les fibres nerveuses.**

Les vaisseaux sanguins, cheminant dans les travées conjonctives intra ganglionnaires, forment des réseaux capillaires, particulièrement développés autour des capsules péricellulaires.

#### 2-Les cellules :

Le parenchyme du ganglion rachidien est composé de 03 types de cellules :

**a- Les cellules nerveuses** (neurones).

**b - Les cellules péricellulaires** (de nature conjonctive).

**c - Les cellules intracapsulaires** (appelées aussi les corpuscules satellites, de nature névroglie).

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE DEPARTEMENT DE MEDECINE.  
DEUXIEME ANNEE DE MEDECINE DE L'ANNEE 2015/2016  
MODULE D'HISTOLOGIE/EMBRYOLOGIE. . Dr. HARHAD- Dr. ADJOURI- Dr. HAMOUM

---

L

### Les cellules du parenchyme ganglionnaire

#### a-Les cellules nerveuses :

- Les neurones du ganglion rachidien se répartissent en 02 types :

\* **Les neurones unipolaires** (pseudo unipolaires en **T de Ranvier**).

\* **Les neurones multipolaires.**

- **Selon leur taille, les neurones unipolaires du ganglion rachidien sont de 02 sortes:**

- Les grandes cellules unipolaires (**neurones de type I de DOGIEL**).

- Les petites cellules unipolaires (**neurones de type II de DOGIEL**).

ndrite




UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE DEPARTEMENT DE MEDECINE.  
DEUXIEME ANNEE DE MEDECINE DE L'ANNEE 2015/2016  
MODULE D'HISTOLOGIE/EMBRYOLOGIE. . Dr. HARHAD- Dr. ADJOURI- Dr. HAMOUM

---

Les grandes cellules unipolaires	Les petites cellules unipolaires
Les plus nombreuses (70 à 80%).	Peu nombreuses (10 à 20 %).
Cytone de grande taille (60 à 120 $\mu$ ) d'aspect clair.	Cytone de petite taille (30 $\mu$ ) d'aspect sombre.
Possèdent une tige protoplasmique unique qui se pelotonne en un glomérule.	Possèdent une tige protoplasmique courte dépourvue de glomérule.
Deux branches de bifurcation (axone et dendrite) myélinisées.	Deux branches de bifurcation (axone et dendrite) minces et amyéliniques.

**\*Les neurones multipolaires:**

- Ils sont rares dans le ganglion rachidien.
- Leur cytone volumineux d'aspect sombre émet de nombreux dendrites et un axone.
- L'axone ne quitte pas le ganglion.



**b- Les cellules péricellulaires :**

Représentées par les fibroblastes d'aspect endothéliforme de la capsule péricellulaire.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE DEPARTEMENT DE MEDECINE.  
DEUXIEME ANNEE DE MEDECINE DE L'ANNEE 2015/2016  
MODULE D'HISTOLOGIE/EMBRYOLOGIE. . Dr. HARHAD- Dr. ADJOURI- Dr. HAMOUM

---

### c- Les cellules intracapsulaires :

Ce sont des cellules aplaties, fusiformes ou stellaires qui sont étroitement unies au neurone ganglionnaire, elles forment une gaine continue d'épaisseur variable, autour du cytone (cellules péricellulaires) et autour de l'axone (cellules périaxoniques) du neurone ganglionnaire.

**\*La capsule péricellulaire ou conjunctivo-endothéliale** comporte 02 couches:

- L'une **périphérique, fibrillaire**, faite de **lamelles collagènes** fines, stratifiées, concentriques.
- L'autre **interne, cellulaire**.

### 3- Les fibres nerveuses :

Selon leur origine, les fibres nerveuses du ganglion rachidien se distinguent en :

**\* Fibres endogènes:** ce sont les prolongements des neurones ganglionnaires c'est à dire:

**Les dendrites** reliant les neurones à la périphérie sensible, et **les axones** à destination médullaire, qui constituent par leur groupement la racine postérieure du nerf rachidien.

**\*Fibres exogènes:** représentées par des fibres nerveuses végétatives en provenance de la moelle épinière, parmi ces fibres :

- Les unes traversent le ganglion sans s'y arrêter pour gagner le tronc du nerf rachidien mixte.
- Les autres se terminent autour des neurones unipolaires par des arborisations péricellulaires ou périganglionnaires.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE DEPARTEMENT DE MEDECINE.  
DEUXIEME ANNEE DE MEDECINE DE L'ANNEE 2015/2016  
MODULE D'HISTOLOGIE/EMBRYOLOGIE. . Dr. HARHAD- Dr. ADJOURI- Dr. HAMOUM

---

**D- Cytophysiologie :**

- **Les grandes cellules unipolaires:** ce sont des neurones **Somato-sensitifs**.
- **Les petites cellules unipolaires:** ce sont des neurones **viscéro-sensitifs**.
- **Les neurones multipolaires :** ce sont des neurones **viscéro- moteurs**, leurs axones se distribuent à la paroi des vaisseaux sanguins intra-ganglionnaires.
- **Les cellules ou corpuscules satellites (cellules intracapsulaires) :** ce sont des cellules névrogliales qui ont une fonction **trophique**, et une fonction **neuronophagique**.

**III. LES GANGLIONS VEGETATIFS :**

**A-Définition :**

Les ganglions végétatifs sont des centres nerveux périphériques situés sur le trajet de la voie efférente du système nerveux **végétatif (autonome)**. Chaque ganglion est le Lieu d'articulation entre :

- 1- Un neurone pré ganglionnaire :** dont le cytone se situe au niveau des centres végétatifs de la moelle épinière.
- 2- Un neurone post ganglionnaire :** dont le cytone se situe au sein même du ganglion.

**B-Origine embryologique :**

Les ganglions végétatifs (**sympathique** et **parasympathique**) ont une double origine embryologique:

**Des crêtes neurales** (d'origine neur ectoblastique) et du **mésenchyme**.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE DEPARTEMENT DE MEDECINE.  
DEUXIEME ANNEE DE MEDECINE DE L'ANNEE 2015/2016  
MODULE D'HISTOLOGIE/EMBRYOLOGIE. . Dr. HARHAD- Dr. ADJOURI- Dr. HAMOUM

---

### **C- Structure histologique :**

Les ganglions sympathiques et parasympathiques présentent une structure histologique identique, on prendra comme type de description **un ganglion sympathique**.

**Sur une coupe longitudinale du ganglion sympathique, on peut reconnaître 03 types de constituants :**

**1-Des formations conjonctives.**

**2- Des cellules.**

**3-Des fibres nerveuses.**



### **Une coupe longitudinale du ganglion sympathique**

#### **1-Les formations conjonctives :**

**-Une capsule périphérique conjonctivo-élastique**, qui enveloppe le ganglion et qui est à l'origine :

**- Des capsules logeant les cytones des cellules nerveuses** : c'est les capsules péricellulaires.

**- Des gaines** enveloppant les fibres nerveuses.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE DEPARTEMENT DE MEDECINE.  
DEUXIEME ANNEE DE MEDECINE DE L'ANNEE 2015/2016  
MODULE D'HISTOLOGIE/EMBRYOLOGIE. . Dr. HARHAD- Dr. ADJOURI- Dr. HAMOUM

---

Les vaisseaux sanguins, cheminent dans les travées conjonctives irrégulières intra ganglionnaires.

## 2- Les cellules :

Le parenchyme du ganglion sympathique est composé de 03 types de cellules :

**a- Les cellules nerveuses** (neurones).

**b - Les cellules péricellulaires** (de nature conjonctive).

**c- Les cellules intracapsulaires** (appelées aussi les corpuscules satellites, de nature névroglie).

### **a-Les cellules nerveuses** :

On retrouve dans le parenchyme ganglionnaire sympathique uniquement des neurones multipolaires. On en distingue 02 types :

- **Les grandes cellules multipolaires.**

- **Les petites cellules multipolaires.**

\* **La grande cellule multipolaire** : se caractérise par :

- **Un cytone** multipolaire, volumineux (40 à 60µ) parfois binucléé.

- **De nombreuses dendrites** d'épaisseur et de longueur variable, les dendrites issues des cytones voisins constituent des dispositifs particuliers connus sous le nom de « **nid** » ou « **papier péricellulaire** ».

- **Un axone** long, amyélinique.

**b-Les cellules péricellulaires** : représentées par les fibroblastes d'aspect endothélioforme de la capsule péricellulaire.

**c-Les cellules intracapsulaires** : ce sont des cellules aplaties, fusiformes ou stellaires qui sont étroitement unies au neurone ganglionnaire, elles forment une gaine continue d'épaisseur variable, autour du **cytone** (cellules **périsomatiques**) et autour de l'**axone** (cellules **périaxoniques**) du neurone ganglionnaire.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE DEPARTEMENT DE MEDECINE.  
DEUXIEME ANNEE DE MEDECINE DE L'ANNEE 2015/2016  
MODULE D'HISTOLOGIE/EMBRYOLOGIE. . Dr. HARHAD- Dr. ADJOURI- Dr. HAMOUM

---

### **3-Les fibres nerveuses :**

Selon leur origine, les fibres nerveuses du ganglion sympathique se distinguent en :

- **Fibres afférentes** : axones myélinisés qui représentent les fibres pré ganglionnaires, leur cytones d'origine se situent dans les centres végétatifs de la moelle épinière.
- **Fibres efférentes** : axones amyéliniques des neurones intra ganglionnaires, elles représentent les fibres post ganglionnaires.

### **D- Cytophysiologie :**

- Les grandes cellules multipolaires : ce sont des neurones **viscéro-moteurs**.
- Les petites cellules multipolaires : ce sont soit Des **neurones d'association dopaminergiques** «entre terminaisons cholinergiques axoniques pré ganglionnaires et dendrites ou cytones ganglionnaires». **Soit Des cellules vasomotrices catécholaminergiques** (noradrénaline, dopamine) associées aux capillaires sanguins intra-ganglionnaires.

### **Tableau Récapitulatif Comparant La Structure Des Ganglions Cérébro-Spinaux Et Végétatifs :**

<b>Ganglion spinal</b>	<b>Ganglion sympathique</b>
Texture histologique ordonnée	Texture histologique désordonnée
Fibres nerveuses groupées en faisceaux à limites précises	Fibres nerveuses groupées en faisceaux à limites peu précises
Cellules unipolaires	Cellules multipolaires
Absences de synapses Cellules satellites +++	Synapses +++ Cellules satellites +